

## ワクチン接種について

2018年1月版

当院では実習および研修中の感染予防対策のために、病棟や外来において患者に接触する実習生/研修生と、実地指導を行う教員すべてを対象として、予め麻疹・水痘・風疹・ムンプス・B型肝炎ウイルスの抗体検査結果またはワクチン接種証明を提出いただくこととなりました。短期間でも患者に濃厚に接する看護実習は、すべての実習生及び教員の提出が必要です。その他の実習生/研修生で、期間が5日以下の場合は免除いたします。ただし、小児科・産婦人科・血液腫瘍内科の実習生は、抗体を獲得した上で実習を行うようにしてください。

なお、以前に当院での実習・研修時に提出したことのある場合においても、再度提出ください（コピー可）。

証明書は、所属施設・学校による証明でも可とします。（医師の証明を必要としていません）

### 実習・研修前に満たすべき要件：

麻疹・風疹・水痘・ムンプス・B型肝炎に対する抗体価がすべて陽性、あるいは必要とするワクチン接種または接種歴（下表）の証明があること

疾患名	抗体価陰性・不明	抗体価低値	抗体価陽性
麻疹	EIA法(IgG)：陰性 PA法：<16倍 中和法：<4倍	EIA法(IgG)：(±)～16.0 PA法：16～128倍 中和法：4倍	EIA法(IgG)：≥16.0 PA法：≥256倍 中和法：≥8倍
風疹	HI法：<8倍 EIA法(IgG)：陰性	HI法：8～16倍 EIA法(IgG)：(±)～8.0	HI法：≥32倍 EIA法(IgG)：≥8.0
水痘	EIA法(IgG)：<2.0 IAHA法：<2倍 中和法：<2倍	EIA法(IgG)：2.0～4.0 IAHA法：2倍 中和法：2倍	EIA法(IgG)：≥4.0 IAHA法：≥4倍 中和法：≥4倍
ムンプス	EIA法(IgG)：陰性	EIA法(IgG)：(±)	EIA法(IgG)：(+)
ワクチン接種または接種歴の証明	2回以上*	1回以上	(不要)

B型肝炎	陰性 (-) (±)・不明	(+) または ≥10 IU/mL
ワクチン接種または接種歴の証明	3回接種*	(不要)

(医療関係者のためのワクチンガイドライン第二版、日本環境感染学会)

\*複数回のワクチン接種が必要な場合で、実習・研修期間までに接種が完了しない場合はその旨を予め連絡した上で、接種後すみやかに報告をしてください。